

Sur la L^2 –cohomologie des variétés à courbure négative

Nader Yeganefar

Abstract

We give a topological interpretation of the space of L^2 -harmonic forms of finite-volume manifolds with sufficiently pinched negative curvature. We give examples showing that this interpretation fails if the curvature is not sufficiently pinched and that our result is sharp with respect to the pinching constants. The method consists first in comparing L^2 –cohomology with weighted L^2 –cohomology thanks to previous works done by T. Ohsawa, and then in identifying these weighted spaces.

Résumé

Nous donnons une interprétation topologique des espaces de formes harmoniques L^2 des variétés de volume fini, à courbure négative suffisamment pincée. Nous donnons des exemples montrant que cette interprétation n'est plus valable si la courbure n'est pas suffisamment pincée et que le résultat est optimal. La méthode utilisée consiste à comparer L^2 –cohomologie et L^2 –cohomologie à poids grâce à des travaux de T. Ohsawa, puis à identifier la L^2 –cohomologie à poids.

Introduction

Soit (M^n, g) une variété riemannienne complète. On note $\mathcal{H}^k(M)$ l'espace des k –formes harmoniques L^2 de M , c'est-à-dire celles qui sont de carré intégrable, fermées et cofermées. Lorsque M est compacte, on sait, grâce au théorème de Hodge-de Rham, que cet espace est de dimension finie, et isomorphe au k –ème espace de cohomologie réelle de M . Quand M est non compacte, ce que nous supposons toujours dans la suite, il est naturel de se demander ce qui subsiste de ce résultat : est-ce que l'espace $\mathcal{H}^k(M)$ est de dimension finie, et si oui peut-on en donner une interprétation topologique ? Par exemple, d'après J. Lott [L3], si M est une variété complète de volume fini, à courbure sectionnelle K négative et pincée (i.e. il existe des réels $0 < a \leq b$, avec $-b^2 \leq K \leq -a^2$), alors tous ses espaces de formes harmoniques sont de dimension finie. De plus, J. Lott a posé la question suivante (MSRI, printemps 2001) :

Question. *Soit (M^n, g) une variété riemannienne complète de dimension*

n , de volume fini, à courbure sectionnelle négative et pincée. Est-il vrai qu'on a les isomorphismes :

$$\mathcal{H}^k(M) \simeq \begin{cases} H^k(M), & \text{si } k < (n-1)/2, \\ \text{Im}(H_c^k(M) \rightarrow H^k(M)), & \text{si } k = n/2, (n \pm 1)/2, \\ H_c^k(M), & \text{si } k > (n+1)/2 ? \end{cases}$$

La réponse à cette question est "oui" dans le cas des variétés hyperboliques de volume fini [Z], [M-P] et des quotients de volume fini de l'espace hyperbolique complexe [Z]. Notre résultat principal est le suivant :

Théorème 0.1. *Soit (M^n, g) , une variété riemannienne complète de dimension n , de volume fini, à courbure sectionnelle K négative pincée : il existe des constantes a et b , telles que l'on ait $-b^2 \leq K \leq -a^2 < 0$. On suppose que $na - (n-2)b > 0$, alors on a les isomorphismes entre espaces vectoriels de dimension finie :*

$$\mathcal{H}^k(M) \simeq \begin{cases} H^k(M), & \text{si } k < (n-1)/2, \\ \text{Im}(H_c^{n/2}(M) \rightarrow H^{n/2}(M)), & \text{si } k = n/2, \\ H_c^k(M), & \text{si } k > (n+1)/2. \end{cases}$$

Si de plus la courbure est constante ($a = b$), et la dimension est impaire, alors on a $\mathcal{H}^{(n \pm 1)/2}(M) \simeq \text{Im}(H_c^{(n \pm 1)/2}(M) \rightarrow H^{(n \pm 1)/2}(M))$.

Ceci signifie que la réponse à la question est affirmative si la courbure est suffisamment pincée. Nous étudierons des exemples qui montrent que la réponse est négative si l'on n'impose pas de conditions sur le pincement, et que notre résultat est optimal.

Avant d'indiquer le schéma de preuve de ce théorème, nous avons besoin de présenter quelques résultats. Tout d'abord, il est connu que les espaces de formes harmoniques admettent une interprétation en termes de L^2 -cohomologie, avec laquelle il est souvent préférable de travailler. Des rappels sur la L^2 -cohomologie seront faits dans la première partie. D'une part, un fait important, dû à J. Lott [L2], est que la finitude de la dimension des espaces de L^2 -cohomologie ne dépend que de la géométrie à l'infini : les espaces de L^2 -cohomologie de deux variétés isométriques en dehors d'un compact sont simultanément de dimension finie ou infinie. On peut donc espérer trouver des liens entre la topologie de la variété, la géométrie à l'infini, et la L^2 -cohomologie. D'autre part, un cas simple où on sait que l'espace des k -formes harmoniques est de dimension finie est celui où zéro n'est pas dans le spectre essentiel du laplacien de Hodge-de Rham Δ_k agissant sur les k -formes différentielles de carré intégrable. Or, on sait, grâce aux travaux de Glazman [G], Donnelly [Do], Anghel [Ang] ou encore Bär [Ba], que le spectre essentiel ne dépend que de la géométrie à l'infini. En effet, plaçons-nous dans un cadre général où (X, g) est une

variété, éventuellement à bord compact, qui est métriquement complète, et soit Δ_k le laplacien défini avec conditions absolues (ou relatives) au bord. Alors 0 n'est pas dans le spectre essentiel de Δ_k si et seulement si on a une inégalité de Poincaré à l'infini : il existe un compact K , et il existe une constante $C > 0$ tels que pour toute k -forme α lisse à support compact dans l'extérieur de K , l'on ait

$$C\|\alpha\|_{L^2} \leq \|\Delta_k \alpha\|_{L^2}.$$

Ces considérations nous amènent à montrer le résultat suivant, qui, sous une hypothèse portant sur le spectre essentiel du laplacien, prouve l'exactitude d'une suite qui relie la cohomologie à support compact $H_c^*(D)$ d'un ouvert D borné à bord régulier de M , à la L^2 -cohomologie $H_2^*(M)$ de M , et à la L^2 -cohomologie absolue $H_2^*(M \setminus D)$ du complémentaire de D :

Théorème 0.2. *Soient (M, g) une variété riemannienne complète, et D un ouvert borné à bord régulier de M . On suppose que pour un certain entier k , 0 n'est pas dans le spectre essentiel de Δ_k . Alors nous avons la suite exacte*

$$\begin{aligned} H_2^{k-1}(M \setminus D) &\xrightarrow{b} H_c^k(D) \xrightarrow{e} H_2^k(M) \xrightarrow{r} H_2^k(M \setminus D) \\ &\xrightarrow{b} H_c^{k+1}(D) \xrightarrow{e} H_2^{k+1}(M) \xrightarrow{r} H_2^{k+1}(M \setminus D) \xrightarrow{b} H_c^{k+2}(D). \end{aligned}$$

Remarque. On énoncera en fait un résultat un peu plus général dans la première partie. Observons aussi que cette suite exacte est bien connue. En effet, si 0 n'est pas dans le spectre essentiel de Δ_k , alors la L^2 -cohomologie et la L^2 -cohomologie non réduite sont les mêmes en degré k , et on sait dans ce cas, d'après les travaux de Cheeger, que la suite est exacte au rang k . De plus, si l'opérateur de Gauss-Bonnet $d + \delta$ est "non-parabolique à l'infini", et vérifie une hypothèse supplémentaire, alors la suite exacte est vraie pour tous les degrés (voir [C1] et [C4] pour plus de détails). Ce qui est intéressant ici, c'est que l'hypothèse sur le spectre essentiel en degré k entraîne aussi l'exactitude de la suite au rang $k + 1$. Ce résultat est probablement bien connu, mais n'ayant pas trouvé de référence précise, nous avons préféré l'inclure ici.

On a aussi une notion d'espaces de L^2 -cohomologie à poids, et ce qui précède reste valable pour ces espaces. Pour prouver le théorème 0.1, notre première tâche sera de montrer :

Proposition 0.3. *Soit (M^n, g) une variété complète de volume fini, à courbure sectionnelle K négative et pincée : il existe deux constantes strictement positives a et b telles que $-b^2 \leq K \leq -a^2 < 0$. Soit $U : M \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction qui sur chaque bout de M est de la forme $U = Cr$, où r est une fonction de Busemann associée au bout, et C une constante vérifiant $C > 2a + (n-1)b$. Alors la L^2 -cohomologie à poids de M , associée au poids e^U , est isomorphe à la cohomologie à support compact de M : $H_{2,U}^*(M) \simeq H_c^*(M)$.*

Indiquons rapidement comment on prouve cette proposition. Le raisonnement est d'ailleurs plus ou moins implicite dans [Do-F]. D'abord, on montre que 0 n'est pas le spectre essentiel du laplacien associé au poids. Ceci repose sur la description précise de la géométrie à l'infini des variétés considérées [E], ainsi que sur une formule d'intégration par parties [Do-X], qui permettent d'avoir une inégalité de Poincaré à l'infini. On a donc la suite exacte précédente pour tout ouvert borné D (la suite exacte est aussi valable pour la L^2 -cohomologie à poids). Ensuite, la même formule d'intégration par parties permet de montrer l'annulation de la L^2 -cohomologie à poids à l'infini (i.e. celle de $M \setminus D$) si D est un ouvert bien choisi. La suite exacte permet alors de conclure.

Pour montrer le théorème 0.1, on doit alors comparer la L^2 -cohomologie de M à des espaces de L^2 -cohomologie à poids, avec des poids bien choisis (voir la proposition 5.1). Ceci se fait grâce à des travaux d'Ohsawa [O], que l'on modifie légèrement, et on obtient ainsi la conclusion du théorème pour les degrés k loin du degré moitié $n/2$. Pour les degrés proches du degré moitié, on aura besoin d'autres arguments, et notamment du théorème d'indice de Ballmann et Brüning [B-B] lorsque n est pair. Ceci sera précisé dans la partie 5.

Le plan de cet article est le suivant : dans la première partie, on commence par faire des rappels sur la L^2 -cohomologie. Ensuite, on énonce et on démontre le théorème concernant la suite exacte. Dans la deuxième partie, on présente la formule d'intégration par parties de Donnelly et Xavier (voir [Do-X], [Do-F], [E-F] et [B-B]), en remarquant qu'elle s'adapte aussi au cas où l'on a un poids. Dans la troisième, on montre un résultat concernant la L^2 -cohomologie à poids. Ahmed et Stroock [A-S] ont traité de tels exemples, mais notre méthode permet d'obtenir des résultats plus généraux :

Théorème 0.4. *Soit (M^n, g) une variété riemannienne complète de dimension n . On suppose qu'il existe une fonction $U : M \rightarrow \mathbb{R}$ qui vérifie les hypothèses suivantes :*

1. U *exhauste* M ,
2. *il existe une constante $\varepsilon > 0$ telle qu'en dehors d'un compact, on ait*

$$\varepsilon^2 \leq |\nabla U|^2,$$

3. *il existe deux constantes $C_1 \leq 0$ et $C_2 \in \mathbb{R}$ telles qu'en dehors d'un compact, on ait*

$$C_1 |\nabla U|^2 \leq HU \leq C_2 |\nabla U|^2.$$

Si $1+nC_1-2nC_2 > 0$, alors 0 n'est pas dans le spectre essentiel de l'opérateur $d + \delta_U$. De plus, les espaces de L^2 -cohomologie à poids de M , associés au

poids e^U , sont de dimension finie, et isomorphes aux espaces de cohomologie à support compact de M : $H_{2,U}^(M) \simeq H_c^*(M)$.*

Dans la quatrième partie, on énonce les résultats d’Ohsawa, en montrant comment ses arguments s’adaptent à notre cas. Dans la cinquième partie, on montre le résultat principal concernant la L^2 –cohomologie des variétés de volume fini, à courbure négative suffisamment pincée. On poursuit par un contre-exemple montrant que le résultat est faux si la courbure n’est pas assez pincée. La partie 6 contient d’autres exemples qui peuvent être traités par la méthode qui a permis de prouver la proposition 0.3. Ainsi, on considère d’abord certains produits tordus, puis on retrouve de manière plus simple le résultat de Mazzeo [M] concernant les formes harmoniques des variétés conformément compactes.

Remerciements. Ce travail a été effectué alors que je suis en thèse sous la direction de G. Carron. Je tiens donc à remercier ce dernier de m’avoir guidé et conseillé, m’exposant ses idées avec enthousiasme et toujours prêt à l’écoute. Je voudrais aussi remercier tous les membres du département de mathématiques de l’Université de Nantes, et en particulier les autres doctorants.

1 Une suite exacte en L^2 –cohomologie

1.1 Rappels sur la L^2 –cohomologie

Nous rappelons d’abord des faits bien connus sur la L^2 –cohomologie (voir entre autres [L1], [L2], ou [C1], [C4]). Soit (M, g) une variété riemannienne complète. On note $C_0^\infty(\Lambda^k T^*M)$ (respectivement $L^2(\Lambda^k T^*M)$, etc...) l’ensemble des k –formes lisses à support compact (respectivement de carré intégrable, etc...) dans M . Le k –ème espace de L^2 –cohomologie (réduite) de M est défini par

$$H_2^k(M) = \{\alpha \in L^2(\Lambda^k T^*M) / d\alpha = 0\} / \overline{dC_0^\infty(\Lambda^{k-1} T^*M)}^{L^2}.$$

Un autre espace très proche souvent considéré est l’espace de L^2 –cohomologie non réduite, qui est le quotient de $\{\alpha \in L^2(\Lambda^k T^*M) / d\alpha = 0\}$ par $\{d\alpha / \alpha \in L^2(\Lambda^{k-1} T^*M), d\alpha \in L^2\}$, sans prendre d’adhérence. En général, L^2 –cohomologie réduite et non réduite ne sont pas égales. Il y a néanmoins égalité en degré k lorsque 0 n’est pas dans le spectre essentiel du laplacien Δ_k , et la proposition 1.3 montre que dans ce cas il y a aussi égalité en degré $k+1$. Dans la suite, “ L^2 –cohomologie” voudra dire “ L^2 –cohomologie réduite”.

Il y a une interprétation de la L^2 –cohomologie en termes de formes harmoniques. En effet, notons $\mathcal{H}^k(M)$ l’espace des k –formes harmoniques L^2 de M :

$$\mathcal{H}^k(M) = \{\alpha \in L^2(\Lambda^k T^*M) / d\alpha = \delta\alpha = 0\},$$

où δ est l'opérateur défini initialement sur les formes lisses à support compact comme l'adjoint de d . Comme M est complète, $\mathcal{H}^*(M)$ est aussi le noyau L^2 du laplacien. Un fait important est la décomposition de Hodge-de Rham-Kodaira [dR, théorème 24] :

$$L^2(\Lambda^k T^* M) = \mathcal{H}^k(M) \oplus \overline{dC_0^\infty(\Lambda^{k-1} T^* M)} \oplus \overline{\delta C_0^\infty(\Lambda^{k+1} T^* M)},$$

et de plus,

$$\{\alpha \in L^2(\Lambda^k T^* M) / d\alpha = 0\} = \mathcal{H}^k(M) \oplus \overline{dC_0^\infty(\Lambda^{k-1} T^* M)}.$$

On en déduit que

$$H_2^k(M) \simeq \mathcal{H}^k(M).$$

Maintenant, si (M, g) est une variété avec un bord compact, et métriquement complète, on peut aussi définir des espaces de L^2 -cohomologie absolue et relative. On note par $C_b^\infty(\Lambda^k T^* M)$ l'espace des k -formes lisses à support borné sur M , le support pouvant rencontrer le bord (contrairement à ce qui se passe pour les éléments de C_0^∞). L'espace de L^2 -cohomologie absolue est alors défini par :

$$H_2^k(M) = (\delta C_0^\infty(\Lambda^{k+1} T^* M))^\perp / \overline{dC_b^\infty(\Lambda^{k-1} T^* M)}.$$

Cet espace est isomorphe à un espace de formes harmoniques vérifiant la condition absolue sur le bord ∂M : si $i_\nu \alpha$ désigne le produit intérieur de la forme α par la normale ν sur ∂M , alors

$$H_2^k(M) \simeq \mathcal{H}_A^k(M) := \{\alpha \in L^2(\Lambda^k T^* M) / d\alpha = \delta\alpha = 0, i_\nu \alpha = 0\}.$$

La L^2 -cohomologie relative, quant à elle, est définie par :

$$H_2^k(M, \partial M) = (\delta C_b^\infty(\Lambda^{k+1} T^* M))^\perp / \overline{dC_0^\infty(\Lambda^{k-1} T^* M)}.$$

Elle est isomorphe à un espace de formes harmoniques vérifiant la condition relative au bord : si i est l'inclusion $\partial M \hookrightarrow M$, alors

$$H_2^k(M, \partial M) \simeq \mathcal{H}_R^k(M) := \{\alpha \in L^2(\Lambda^k T^* M) / d\alpha = \delta\alpha = 0, i^* \alpha = 0\}.$$

Nous terminons cette partie par la présentation de la L^2 -cohomologie à poids. Si $U : M \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction lisse définie sur M , on pose $dv_U = e^U dv_g$, où dv_g est la mesure riemannienne associée à g . On peut alors considérer l'adjoint δ_U de d par rapport à cette mesure dv_U :

$$\delta_U = e^{-U} \delta e^U.$$

Tout ce qui a été dit précédemment reste alors valable en remplaçant δ par δ_U . En particulier, on peut définir les espaces de L^2 -cohomologie à poids $H_{2,U}^k(M)$ par rapport au poids U (ou plus précisément par rapport au poids e^U). De plus, si on note L_U^2 l'espace des formes de carré intégrable par rapport à la mesure dv_U , alors on a l'identification

$$H_{2,U}^k(M) \simeq \mathcal{H}_U^k(M) := \{\alpha \in L_U^2(\Lambda^k T^* M) / d\alpha = \delta_U \alpha = 0\}.$$

1.2 L^2 -cohomologie et spectre du laplacien

Remarque préliminaire. Dans tout ce qui suit, nous ne considérons, pour simplifier, que la L^2 -cohomologie sans poids. Cependant, tous les résultats restent aussi valables avec un poids.

Dans cette partie, nous présentons la suite exacte dont il est question dans l'introduction.

Théorème 1.1. *Soient (M, g) une variété riemannienne complète, et D un ouvert à bord compact et régulier de M . On suppose que pour un certain entier k , 0 n'est pas dans le spectre essentiel de Δ_k . Alors nous avons la suite exacte*

$$\begin{aligned} H_2^{k-1}(M) &\xrightarrow{r} H_2^{k-1}(M \setminus D) \xrightarrow{b} H_2^k(D, \partial D) \xrightarrow{e} H_2^k(M) \\ &\xrightarrow{r} H_2^k(M \setminus D) \xrightarrow{b} H_2^{k+1}(D, \partial D) \xrightarrow{e} H_2^{k+1}(M) \xrightarrow{r} H_2^{k+1}(M \setminus D). \end{aligned}$$

Avant de démontrer ce théorème, nous avons besoin de quelques résultats préliminaires, mais avant tout, précisons les applications r , e et b qui interviennent dans la suite exacte.

- $r : H_2^*(M) \rightarrow H_2^*(M \setminus D)$ est l'application de restriction induite en L^2 -cohomologie par l'inclusion $M \setminus D \hookrightarrow M$.
- e est l'extension par zéro : si $[\alpha] \in H_2^*(D, \partial D)$, de représentant α , on définit $\tilde{\alpha}$ sur M par $\tilde{\alpha} = \alpha$ sur D , et $\tilde{\alpha} = 0$ sur $M \setminus D$. On vérifie que $\tilde{\alpha}$ est faiblement fermée, et on pose $e[\alpha] = [\tilde{\alpha}]$. Ceci est indépendant du représentant choisi.
- b se définit comme l'homomorphisme cobord ordinaire en cohomologie de de Rham : si $[\alpha]$ est une classe dans $H_2^k(M \setminus D)$, on peut choisir un représentant α qui soit fermé et lisse. Il existe alors une k -forme $\bar{\alpha}$ lisse sur M , qui coïncide avec α sur $M \setminus D$, et qui vérifie $d\bar{\alpha} = 0$ sur un voisinage de $M \setminus D$. On impose de plus que $\bar{\alpha}$ et $d\bar{\alpha}$ soient de carré intégrable (c'est toujours possible, car le bord ∂D étant compact, on peut choisir $\bar{\alpha}$ telle que $\bar{\alpha}|_D$ soit à support borné). On vérifie que la classe de $d\bar{\alpha}$ dans $H_2^{k+1}(D, \partial D)$ est indépendante du représentant lisse α choisi, ainsi que du prolongement $\bar{\alpha}$, et on pose $b[\alpha] = [d\bar{\alpha}]$.

Pour la démonstration du théorème 1.1, nous aurons besoin du résultat classique suivant (version facile du théorème 1.5 de [C1]) :

Proposition 1.2. *Soit (M, g) une variété complète. On suppose que pour un entier k donné, 0 n'est pas dans le spectre essentiel de Δ_k . Alors il existe un opérateur de Green continu*

$$G = G_- \oplus G_+ : L^2(\Lambda^k T^* M) \rightarrow L^2(\Lambda^{k-1} T^* M) \oplus L^2(\Lambda^{k+1} T^* M),$$

tel que pour toute forme $\alpha \in L^2(\Lambda^k T^*M)$, on ait

$$\alpha = P\alpha + dG_-\alpha + \delta G_+\alpha,$$

où P désigne la projection orthogonale sur le noyau du laplacien. De plus, si α est lisse, alors $G\alpha$ est aussi lisse. Enfin, si α est nulle dans $H_2^k(M)$, alors $\alpha = dG_-\alpha$.

Démonstration. Comme 0 n'est pas dans le spectre essentiel de Δ_k , il existe un opérateur de Green (borné)

$$A : L^2(\Lambda^k T^*M) \rightarrow \text{Dom}(\Delta^k) \subset L^2(\Lambda^k T^*M),$$

tel que $\Delta A = \text{Id} - P$ sur $L^2(\Lambda^k T^*M)$. L'opérateur G se définit par

$$G\alpha = \delta A\alpha + dA\alpha.$$

G est borné sur L^2 , car A envoie continûment L^2 dans le domaine de Δ , et on a $(d + \delta)^2 = \Delta$ au sens opérateur. On voit alors facilement que G vérifie les assertions de l'énoncé. $\square$

Remarque. Comme on l'a rappelé dans l'introduction, l'hypothèse sur le spectre essentiel ne dépend que de la géométrie à l'infini. Ainsi, si on revient aux hypothèses de la proposition, le laplacien défini sur D ou $M \setminus D$ avec conditions absolues ou relatives au bord vérifie aussi l'assertion sur le spectre essentiel, donc la même preuve s'adapte à ce cas, et on obtient l'existence d'un opérateur de Green.

La proposition suivante est essentielle pour montrer le décalage dans la suite exacte :

Proposition 1.3. *Soit (X, g) une variété riemannienne avec éventuellement un bord compact, métriquement complète. On suppose que 0 n'est pas dans le spectre essentiel du laplacien Δ_k , défini avec conditions absolues ou relatives au bord. Soit α une forme différentielle dans $L^2 \cap C^\infty$, de degré k ou $k + 1$. Si α est nulle dans $H_2^*(X)$ (respectivement dans $H_2^*(X, \partial X)$), alors il existe une forme β lisse dans le domaine $\text{Dom}((d + \delta)^A)$ de l'opérateur $d + \delta$ défini avec condition absolue sur le bord (respectivement dans le domaine $\text{Dom}((d + \delta)^R)$ de l'opérateur $d + \delta$ défini avec condition relative sur le bord), cofermée, et vérifiant $\alpha = d\beta$.*

Démonstration. Le cas où α est de degré k découle de la proposition 1.2 et de la remarque qui suit sa preuve. On fait la démonstration uniquement dans le cas où X a un bord, et où α est de degré $k + 1$, nulle dans $H_2^*(X)$. Cette nullité signifie qu'il existe une suite β_l de k -formes lisses à supports bornés telle que $\alpha = \lim d\beta_l$. On note Δ_k^A le laplacien défini avec conditions absolues sur le bord, P^A la projection orthogonale sur le noyau $\text{Ker}(\Delta_k^A)$, et $(d + \delta)_k^A$ la restriction de l'opérateur $(d + \delta)^A$ aux k -formes. L'hypothèse

sur le spectre essentiel montre, grâce à la proposition 1.2, qu'il existe un opérateur de Green G^A pour l'opérateur $(d + \delta)_k^A$, qui envoie l'espace L^2 dans le domaine de $(d + \delta)^A$. On peut donc écrire

$$\beta_l = P^A(\beta_l) + dG_-^A\beta_l + \delta G_+^A\beta_l.$$

Or $G_+^A\beta_l$ vérifie la condition absolue au bord : $i_\nu G_+^A\beta_l = 0$, où i_ν désigne le produit intérieur par la normale ν sur le bord ∂X ; donc $\delta G_+^A\beta_l$ vérifie aussi cette condition absolue. Par conséquent, quitte à remplacer β_l par $\delta G_+^A\beta_l$, on peut supposer que β_l est dans le domaine de $(d + \delta)_k^A$, cofermée, orthogonale au noyau $\text{Ker}(\Delta_k^A)$, et que les $d\beta_l$ (qui restent dans C_b^∞) continuent de converger vers α . De plus, il existe une constante $C > 0$ telle que :

$$\forall \varphi \in \text{Dom}((d + \delta)_k^A), \varphi \perp \text{Ker}(\Delta_k^A), C\|\varphi\|_{L^2}^2 \leq \|d\varphi\|_{L^2}^2 + \|\delta\varphi\|_{L^2}^2.$$

Cette inégalité montre alors que (β_l) est une suite de Cauchy dans L^2 , par conséquent il existe une k -forme β telle que $\beta_l \rightarrow \beta$ dans L^2 . On a donc $d\beta_l \rightarrow d\beta$ au sens des distributions, mais comme $d\beta_l \rightarrow \alpha$ dans L^2 , ceci montre que $\alpha = d\beta$ au sens des distributions. D'autre part, les β_l sont cofermées, donc on a aussi $\delta\beta = 0$ au sens des distributions. Ainsi, on a $(d + \delta)(\beta) = \alpha$ au sens des distributions, et comme α est lisse, par régularité elliptique de l'opérateur $d + \delta$, β est aussi lisse, et on a finalement $\alpha = d\beta$. Enfin, comme $\beta_l \in \text{Dom}((d + \delta)_k^A)$ converge vers α dans L^2 , et que $(d + \delta)^A\beta_l$ converge vers $d\alpha$ dans L^2 , le fait que l'opérateur $(d + \delta)^A$ soit fermé entraîne que β est dans le domaine $\text{Dom}((d + \delta)_k^A)$. $\square$

On va maintenant pouvoir passer à la preuve du théorème 1.1 (voir aussi [C1] ou [C4]). Tout d'abord, par construction on a toujours

$$r \circ e = 0, \quad b \circ r = 0, \quad e \circ b = 0,$$

donc

$$\text{Im}(e) \subset \text{Ker}(r), \quad \text{Im}(r) \subset \text{Ker}(b), \quad \text{Im}(b) \subset \text{Ker}(e).$$

Montrons que $\text{Ker}(r) \subset \text{Im}(e)$. Soit $[\alpha] \in H_2^*(M)$ telle que $r[\alpha] = 0$. Si α est de degré k ou $k + 1$, grâce à la proposition 1.3, il existe une forme lisse β dans $L^2(\Lambda^k T^*(M \setminus D))$, telle que $\alpha|_{M \setminus D} = d\beta$. Si $\bar{\beta} \in L^2(\Lambda^k T^*M)$ est une extension lisse de β , alors on voit que $e[\alpha - d\bar{\beta}] = [\alpha]$.

Montrons maintenant que $\text{Ker}(e) \subset \text{Im}(b)$. Soit α une forme de degré k ou $k + 1$, de carré intégrable sur D , avec $d\alpha = \delta\alpha = 0$, et $i^*\alpha = 0$, où i est l'inclusion $\partial D \hookrightarrow D$. Si $\tilde{\alpha}$ désigne l'extension par zéro de α , on suppose que $\tilde{\alpha}$ est nulle en L^2 -cohomologie (i.e. $[\alpha] \in \text{Ker}(e)$). Grâce à la proposition 1.3, on écrit $\tilde{\alpha} = d\beta$, avec β cofermée, et comme $\tilde{\alpha}$ est lisse sur D et $M \setminus D$, β est aussi lisse sur D et sur $M \setminus D$. Soit $\bar{\beta}$ une extension lisse de $\beta|_{M \setminus D}$ comme dans la définition de l'application b . Alors on a $\alpha - d\bar{\beta} = d(\beta - \bar{\beta})$, avec $\beta - \bar{\beta}$ lisse sur D , de carré intégrable, et de tiré en arrière nul sur ∂D . Donc $\alpha - d\bar{\beta}$ est L^2 -cohomologue à zéro, c'est-à-dire que $[\alpha] = b[\beta|_{M \setminus D}]$.

Enfin, montrons que $\text{Ker}(b) \subset \text{Im}(r)$. Soit $[\alpha] \in \text{Ker}(b)$: avec les notations précédentes, ceci signifie que $d\bar{\alpha}|_D$ est nulle dans $H_2^*(D, \partial D)$. Si α est de degré $k-1$ ou k , alors d'après la proposition 1.3, il existe une forme β définie sur D , de carré intégrable, vérifiant la condition relative $i^*\beta = 0$ au bord, et telle que $d\bar{\alpha}|_D = d\beta$. On note $\tilde{\beta}$ l'extension par zéro de β sur M . La forme $\bar{\alpha} - \tilde{\beta}$ est fermée (faiblement), de carré intégrable, et on a $r[\bar{\alpha} - \tilde{\beta}] = [\alpha]$. $\square$

Dans le but de relier L^2 -cohomologie et topologie, il est utile de remarquer :

Corollaire 1.4. *Soient (M, g) une variété riemannienne complète, et D un ouvert borné à bord régulier de M . On suppose que pour un certain entier k , 0 n'est pas dans le spectre essentiel de Δ_k . Alors nous avons les deux suites exactes*

$$\begin{aligned} H_2^{k-1}(M \setminus D) &\xrightarrow{b} H_c^k(D) \xrightarrow{e} H_2^k(M) \xrightarrow{r} H_2^k(M \setminus D) \\ &\xrightarrow{b} H_c^{k+1}(D) \xrightarrow{e} H_2^{k+1}(M) \xrightarrow{r} H_2^{k+1}(M \setminus D) \xrightarrow{b} H_c^{k+2}(D), \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} H_2^{k-1}(M \setminus D, \partial D) &\xrightarrow{e} H_2^{k-1}(M) \xrightarrow{r} H^{k-1}(D) \xrightarrow{b} H_2^k(M \setminus D, \partial D) \\ &\xrightarrow{e} H_2^k(M) \xrightarrow{r} H^k(D) \xrightarrow{b} H_2^{k+1}(M \setminus D, \partial D) \xrightarrow{e} H_2^{k+1}(M) \xrightarrow{r} H^{k+1}(D). \end{aligned}$$

Démonstration. La première suite est une conséquence directe du théorème 1.1, si l'on observe d'une part que $H_2^*(D, \partial D) \simeq H_c^*(D)$, car D est borné, et d'autre part que l'égalité $\text{Ker}(b) = \text{Im}(r)$ est toujours vraie lorsque D est borné (c'est une conséquence de la suite usuelle en cohomologie de de Rham, voir par exemple [C4] ou [L2]). La deuxième suite découle aussi du théorème 1.1, si l'on échange D en $M \setminus D$ dans ce théorème, puis si l'on se sert du fait que l'hypothèse D borné entraîne $H_2^*(D) \simeq H^*(D)$, et $\text{Ker}(r) = \text{Im}(e)$. $\square$

2 Une formule d'intégration par parties

Le but de cette partie est de présenter une formule d'intégration par parties pour l'opérateur $d + \delta$. Cette formule et ses corollaires seront utiles pour l'étude de la L^2 -cohomologie de certains types de variétés. Le théorème principal est d'abord dû à Donnelly et Xavier [Do-X] ; une démonstration plus synthétique en est aussi donnée par Escobar et Freire dans [E-F]. Ensuite Ballmann et Brüning [B-B] ont étendu cette formule au cadre plus large des opérateurs de type Dirac et ont amélioré les résultats de Donnelly et Xavier.

Avant d'énoncer le résultat principal, nous faisons la remarque suivante : si f est une fonction de classe C^2 sur une variété riemannienne M , alors son hessien Hf se prolonge à une forme bilinéaire symétrique sur $\Lambda^k T^*M$

comme suit

$$Hf(\alpha, \beta) = \sum_{i,j} Hf(X_i, X_j) \langle i_{X_i} \alpha, i_{X_j} \beta \rangle, \quad (2.1)$$

où les X_i forment un repère orthonormal local et $i_X \alpha$ désigne le produit intérieur de la forme α par le champ de vecteurs X (la formule est bien entendu indépendante du choix d'un tel repère). Nous avons alors, suivant [E-F] :

Théorème 2.1. *On considère (M^n, g) une variété riemannienne complète. Soient f une fonction de classe C^2 sur M de gradient borné, Ω un ouvert (à bord compact assez régulier) de M , et α une forme différentielle dans le domaine de l'opérateur $d + \delta$, lisse jusqu'au bord de Ω . On note ν la normale unitaire sortante sur $\partial\Omega$, et $d\sigma$ la mesure riemannienne induite sur le bord $\partial\Omega$. Alors*

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} [2Hf(\alpha, \alpha) + \Delta f |\alpha|^2] dv_g = \\ 2 \int_{\Omega} [\langle i_{\nabla f} d\alpha, \alpha \rangle + \langle i_{\nabla f} \alpha, \delta \alpha \rangle] dv_g + \int_{\partial\Omega} \left[-|\alpha|^2 \frac{\partial f}{\partial \nu} + 2 \langle i_{\nabla f} \alpha, i_{\nu} \alpha \rangle \right] d\sigma. \end{aligned}$$

Nous ne refaisons pas la démonstration. L'idée est de montrer l'équation

$$Hf(\alpha, \alpha) + \langle \nabla_{\nabla f} \alpha, \alpha \rangle = \langle di_{\nabla f} \alpha, \alpha \rangle + \langle i_{\nabla f} d\alpha, \alpha \rangle, \quad (2.2)$$

valable pour toute forme différentielle α . Puis on intègre cette relation sur un ouvert par rapport à la mesure riemannienne dv_g , et on fait des intégrations par parties sur les deux termes où apparaissent $\langle \nabla_{\nabla f} \alpha, \alpha \rangle = 1/2 \nabla f \cdot |\alpha|^2$ et $\langle di_{\nabla f} \alpha, \alpha \rangle$.

Le premier corollaire que nous en déduisons se trouve dans [Do-X] et [B-B] sous une forme légèrement différente, et consiste à considérer le cas particulier des formes à support compact.

Corollaire 2.2. *Soit f une fonction de classe C^2 sur M^n telle que $|\nabla f|$ soit borné sur M . On considère α une forme lisse à support compact, alors on a l'estimation*

$$\left| \int_M [2Hf(\alpha, \alpha) + \Delta f |\alpha|^2] \right| \leq 2 \sup_M (|\nabla f|) [\|d\alpha\|_{L^2} + \|\delta\alpha\|_{L^2}] \|\alpha\|_{L^2}$$

Démonstration. On considère un ouvert Ω qui contient le support de α (dans son intérieur), donc dans l'égalité du théorème précédent, il n'y a plus de termes de bord. On majore le deuxième membre de cette égalité en utilisant le fait que $|i_X \alpha| \leq |X| |\alpha|$ pour tout champ de vecteurs X , puis en utilisant des inégalités de Cauchy-Schwarz, pour arriver au résultat annoncé.

□

Cette idée s'adapte aussi au cas où l'on a un poids $U : M \rightarrow \mathbb{R}$. En effet, si on repart de l'égalité 2.2, et si on l'intègre par rapport à la mesure $dv_U = e^U dv_g$, alors par intégration par parties, on trouve

Corollaire 2.3. *Soient f et U deux fonctions de classe C^2 sur (M, g) , et Ω un ouvert à bord compact et régulier de M . Si α est une forme différentielle lisse et à support borné dans Ω (le support pouvant rencontrer le bord), on a*

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} [2Hf(\alpha, \alpha) + \Delta f |\alpha|^2 - \langle \nabla f, \nabla U \rangle |\alpha|^2] dv_U = \\ & 2 \int_{\Omega} [\langle i_{\nabla f} d\alpha, \alpha \rangle + \langle i_{\nabla f} \alpha, \delta \alpha \rangle] dv_U + \int_{\partial \Omega} \left[-|\alpha|^2 \frac{\partial f}{\partial \nu} + 2 \langle i_{\nabla f} \alpha, i_{\nu} \alpha \rangle \right] e^U d\sigma. \end{aligned}$$

3 Un cas de L^2 -cohomologie à poids

3.1 Cas "général"

Soient (M^n, g) une variété riemannienne non compacte, et $U : M \rightarrow [0, \infty[$ une fonction qui croît assez vite à l'infini pour que le volume de M par rapport à la mesure $dv_{(-U)} = e^{-U} dv_g$ soit fini, où dv_g est la mesure riemannienne associée à g . Dans [A-S], Ahmed et Stroock montrent, sous certaines hypothèses géométriques (courbure de Ricci minorée, opérateur de courbure majoré), et d'autres hypothèses portant sur la fonction U , que les espaces de cohomologie L^2 à poids sont de dimension finie, et isomorphes aux espaces de cohomologie réelle de M . Nous allons voir que sous des hypothèses beaucoup moins restrictives, ce résultat reste valable. En fait, nous nous intéressons d'abord à des poids e^U , plutôt que e^{-U} , mais la preuve de notre résultat s'applique indifféremment aux deux cas.

Théorème 3.1. *Soit (M^n, g) une variété riemannienne complète de dimension n . On suppose qu'il existe une fonction $U : M \rightarrow \mathbb{R}$ qui vérifie les hypothèses suivantes :*

1. U *exhauste* M ,
2. *il existe une constante $\varepsilon > 0$ telle qu'en dehors d'un compact, on ait*

$$\varepsilon^2 \leq |\nabla U|^2,$$

3. *il existe deux constantes $C_1 \leq 0$ et $C_2 \in \mathbb{R}$ telles qu'en dehors d'un compact, on ait*

$$C_1 |\nabla U|^2 \leq HU \leq C_2 |\nabla U|^2.$$

Si $\eta := 1 + nC_1 - 2nC_2 > 0$, alors 0 n'est pas dans le spectre essentiel de l'opérateur $d + \delta_U$. De plus, les espaces de L^2 -cohomologie à poids de M , associés au poids e^U , sont de dimension finie, et isomorphes aux espaces de cohomologie à support compact de M : $H_{2,U}^(M) \simeq H_c^*(M)$.*

Remarque. Si $C_2 \leq 0$, alors on a le même résultat en supposant que $1 + nC_1 > 0$ (voir la preuve du théorème).

Démonstration. On montre d'abord que sous nos hypothèses, zéro n'est pas dans le spectre essentiel de $d + \delta_U$. Soit $c > 0$ un réel tel qu'en dehors de l'ouvert borné $D = \{U < c\}$, les hypothèses 2 et 3 du théorème soient vérifiées. Si α est une forme de degré k sur $M \setminus D$, lisse et à support borné, on a, d'après la formule d'intégration par parties du corollaire 2.3 (en prenant $f = U$ dans les notations de ce corollaire) :

$$\begin{aligned} & \int_{M \setminus D} [2HU(\alpha, \alpha) + \Delta U |\alpha|^2 - |\nabla U|^2 |\alpha|^2] dv_U = \\ & 2 \int_{M \setminus D} [\langle i_{\nabla U} d\alpha, \alpha \rangle + \langle i_{\nabla U} \alpha, \delta \alpha \rangle] dv_U + \int_{\partial D} \left[-|\alpha|^2 \frac{\partial U}{\partial \nu} + 2 \langle i_{\nabla U} \alpha, i_\nu \alpha \rangle \right] e^U d\sigma, \end{aligned} \quad (3.3)$$

où ν est la normale unitaire extérieure sur ∂D , donc $\nu = -\nabla U / |\nabla U|$ ici. Or, on a l'estimation suivante :

$$\begin{aligned} 2HU(\alpha, \alpha) + \Delta U |\alpha|^2 - |\nabla U|^2 |\alpha|^2 & \leq (-1 + 2kC_2 - nC_1) |\nabla U|^2 |\alpha|^2 \\ & \leq -\eta |\nabla U|^2 |\alpha|^2. \end{aligned}$$

On considère de plus que α est une forme différentielle vérifiant la condition absolue au bord $i_\nu \alpha = 0$. Le terme de bord de l'égalité 3.3 est alors positif car $-\partial U / \partial \nu = |\nabla U|$, donc compte tenu de l'inégalité précédente, on a

$$\begin{aligned} \eta \int_{M \setminus D} |\nabla U|^2 |\alpha|^2 dv_U & \leq -2 \int_{M \setminus D} [\langle i_{\nabla U} d\alpha, \alpha \rangle + \langle i_{\nabla U} \alpha, \delta_U \alpha \rangle] dv_U \\ & \leq 2 \left(\int_{M \setminus D} |\nabla U|^2 |\alpha|^2 dv_U \right)^{1/2} \\ & \quad \left[\|d\alpha\|_{L^2_U(M \setminus D)} + \|\delta_U \alpha\|_{L^2_U(M \setminus D)} \right], \end{aligned}$$

où pour passer de la première à la deuxième inégalité, on a d'abord utilisé l'inégalité $|i_X \beta| \leq |X| |\beta|$, valable pour tout champ de vecteurs X et toute forme β , et ensuite des inégalités de Cauchy-Schwarz. On en déduit finalement que pour toute forme α à support borné dans $M \setminus D$, vérifiant la condition absolue $i_\nu \alpha = 0$:

$$\eta \varepsilon / 2 \|\alpha\|_{L^2_U(M \setminus D)} \leq \|d\alpha\|_{L^2_U(M \setminus D)} + \|\delta_U \alpha\|_{L^2_U(M \setminus D)} \quad (3.4)$$

Cette inégalité est en particulier vraie pour des formes lisses à support compact dans $M \setminus D$, donc on a une inégalité de Poincaré à l'infini, et par conséquent 0 n'est pas dans le spectre essentiel de l'opérateur $d + \delta_U$. On a alors une suite exacte pour la L^2 -cohomologie à poids, analogue à la

première suite exacte du corollaire 1.4, c'est-à-dire que pour tout entier k , la suite

$$H_c^k(D) \xrightarrow{e} H_{2,U}^k(M) \xrightarrow{r} H_{2,U}^k(M \setminus D) \xrightarrow{b} H_c^{k+1}(D)$$

est exacte. On va montrer que la L^2 -cohomologie absolue à poids de $M \setminus D$ est nulle (c'est-à-dire $H_{2,U}^*(M \setminus D) = 0$). Soit donc α une forme de $L_U^2(M \setminus D)$, $(d + \delta_U)$ -harmonique, et satisfaisant la condition absolue au bord $i_\nu \alpha = 0$. On considère une suite ρ_l de fonctions lisses définies sur $M \setminus D$, à supports bornés, vérifiant :

$$|\rho_l| \leq 1, \quad \rho_l \rightarrow 1 \ (l \rightarrow \infty), \quad |d\rho_l| \leq 1, \quad \text{et } d\rho_l \rightarrow 0 \text{ sur les compacts.}$$

On applique alors l'inégalité 3.4 à $\rho_l \alpha$, puis on fait tendre l vers l'infini, pour montrer que α est nulle. Ceci montre que

$$H_{2,U}^k(M) \simeq H_c^k(D),$$

et ceci pour tout ouvert $D = \{U < c\}$. En faisant tendre c vers l'infini, on trouve le résultat souhaité. $\square$

3.2 Cas des variétés de volume fini, à courbure négative et pincée

Dans cette partie, (M^n, g) est une variété riemannienne complète de volume fini. On suppose de plus que la courbure sectionnelle K de M est négativement pincée, c'est-à-dire qu'il existe des constantes a et b , avec

$$-b^2 \leq K \leq -a^2 < 0.$$

On rappelle des résultats concernant la géométrie de telles variétés (voir [E], [H-I], ou encore le résumé de [L3]) : M est difféomorphe à l'intérieur d'une variété compacte à bord. Si Σ est l'une des composantes (en nombre fini) du bord, il y a un bout correspondant. A tout rayon géodésique d'un bout, on associe une fonction de Busemann r (deux telles fonctions ne diffèrent que d'une constante). Dans le cas général, r est seulement de classe C^2 . Si B est un bout associé à la composante de bord Σ , alors B est C^2 -difféomorphe à $]0, \infty[\times \Sigma$, les tranches $\{t\} \times \Sigma$ étant les niveaux d'une fonction de Busemann r . Par ce difféomorphisme, la métrique s'écrit

$$g = dr^2 + g_r,$$

où les g_r sont une famille de métriques sur Σ .

La preuve du théorème 3.1 s'adapte aussi au cas des variétés de volume fini, à courbure négative et pincée :

Corollaire 3.2. *Soit (M^n, g) une variété complète de volume fini, à courbure sectionnelle K négative et pincée : il existe deux constantes strictement positives a et b telles que $-b^2 \leq K \leq -a^2 < 0$. Soit $U : M \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction qui sur chaque bout de M est de la forme $U = Cr$, où r est une fonction de Busemann associée au bout, et C une constante vérifiant $C > 2a + (n-1)b$. Alors la L^2 -cohomologie à poids de M , associée au poids e^U , est isomorphe à la cohomologie à support compact de M : $H_{2,U}^*(M) \simeq H_c^*(M)$.*

Démonstration. On procède de manière similaire à la preuve précédente (théorème 3.1), en majorant le membre de gauche de la formule d'intégration par parties 3.3. Pour cela, on se sert du théorème de comparaison des hessiens de Greene et Wu (voir [G-W, p. 19]) qui montre que si $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ sont les valeurs propres du hessien Hr d'une fonction de Busemann, alors $\lambda_1 = 0$, et $-b \leq \lambda_i \leq -a$, pour $i \geq 2$. Ainsi, pour toute forme de degré k , on a

$$\begin{aligned} 2HU(\alpha, \alpha) + \Delta U|\alpha|^2 - |\nabla U|^2|\alpha|^2 &\leq C(2(1-k)a + (n-1)b - C)|\alpha|^2 \\ &\leq C(2a + (n-1)b - C)|\alpha|^2, \end{aligned}$$

puis on conclut comme avant. $\square$

Remarque. Comme on l'a déjà suggéré, on peut faire des raisonnements analogues si on considère le poids e^{-U} . Ainsi, si M et U vérifient les hypothèses 1, 2 et 3 du théorème 3.1, avec $1 + 2nC_1 - nC_2 > 0$ (ou bien $C_1 \leq 0$ et $1 - nC_2 > 0$), alors la L^2 -cohomologie à poids de M , associée au poids e^{-U} , est isomorphe à la cohomologie réelle de M . De façon similaire, si M et U sont comme dans le corollaire précédent, avec $C > 2nb - (n-1)a$, alors la L^2 -cohomologie associée au poids e^{-U} est aussi isomorphe à la cohomologie réelle.

4 Un détour par les travaux d'Ohsawa

Dans [O] (voir aussi [O-T]), T. Ohsawa développe une théorie afin d'obtenir des théorèmes d'isomorphisme pour les groupes de cohomologie d'une large classe de variétés complexes. Sa théorie des "pseudo-paires de Runge" est en effet assez générale, et permet de comparer les groupes de L^2 -cohomologie et de cohomologie ordinaire. Ici, nous nous contentons de voir que cette méthode marche dans un cadre plus simple et légèrement différent. Tout d'abord, nous avons besoin d'introduire la définition suivante, qui est l'équivalent de la notion de pseudo-paire de Runge chez Ohsawa :

Définition 4.1. *Soient (M, g) une variété riemannienne complète, k un entier, et $U : M \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 définie sur M . On considère une suite de fonctions $U_p : M \rightarrow \mathbb{R}$ définies sur M , de classe C^2 . On dit que la suite U_p est une bonne suite de poids par rapport à U en degré k si elle satisfait aux conditions suivantes :*

- (1) Pour tout compact L de M , il existe un entier p_0 (dépendant de L) tel que $U_p|_L = U|_L$ pour $p \geq p_0$.
- (2) (Inégalités de Poincaré à l'infini uniformes) Il existe un compact K de M , et une constante $C_1 > 0$ tels que pour tout $p \geq 1$, l'on ait

$$\forall \alpha \in C_0^\infty(\Lambda^k T^*(M)), \|\alpha\|_{L_{U_p}^2}^2 \leq C_1 \left[\|d\alpha\|_{L_{U_p}^2}^2 + \|\delta_{U_p} \alpha\|_{L_{U_p}^2}^2 + \int_K |\alpha|^2 dv_{U_p} \right].$$

- (3) $L_{U_p}^2(\Lambda^j T^* M) \subset L_{U_{p+1}}^2(\Lambda^j T^* M)$, et il existe une constante $C_2 > 0$ telle que $\|\cdot\|_{L_U^2(\Lambda^j T^* M)} \leq C_2 \|\cdot\|_{L_{U_p}^2(\Lambda^j T^* M)}$, pour tout $p \geq 1$, et $j = k-1, k$.

Remarque. Il n'est pas difficile de voir que la condition (2) est équivalente à : il existe un compact K' de M , et une constante $C' > 0$ tels que pour tout $p \geq 1$, l'on ait

$$\forall \alpha \in C_0^\infty(\Lambda^k T^*(M \setminus K')), \|\alpha\|_{L_{U_p}^2}^2 \leq C' \left[\|d\alpha\|_{L_{U_p}^2}^2 + \|\delta_{U_p} \alpha\|_{L_{U_p}^2}^2 \right],$$

et dans la pratique, c'est cette condition qu'on vérifiera.

Théorème 4.2 (Ohsawa). Soient (M, g) une variété riemannienne complète, k un entier, et $U : M \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 définie sur M . On suppose qu'il existe une bonne suite de poids U_p par rapport à U en degrés k et $k+1$ (c'est la même suite pour les deux degrés). Alors il existe un entier p_0 tel que les applications naturelles $H_{2, U_p}^k(M) \rightarrow H_{2, U}^k(M)$ soient des isomorphismes pour $p \geq p_0$.

Comme notre cadre est un peu différent de celui considéré par Ohsawa, et pour être plus complet, nous refaisons la démonstration de ce théorème en reprenant les arguments de la preuve de [O, théorème 3.2, chapitre 2]. Pour cela, nous avons besoin tout d'abord de quelques résultats préliminaires. Dans la suite, M est une variété riemannienne complète, et U une fonction de classe C^2 définie sur M . En premier lieu, l'analogie de [O, lemme 2.2, chapitre 2] est

Proposition 4.3. On suppose qu'il existe une bonne suite de poids U_p par rapport à U en degré k . Alors il existe un entier p_0 et une constante $C_3 > 0$ tels que pour tout $p \geq p_0$ l'on ait

$$\forall \alpha \in L_{U_p}^2(\Lambda^k T^* M), \alpha \perp_U \mathcal{H}_U^k, \|\alpha\|_{L_{U_p}^2}^2 \leq C_3 \left[\|d\alpha\|_{L_{U_p}^2}^2 + \|\delta_{U_p} \alpha\|_{L_{U_p}^2}^2 \right].$$

Démonstration. Nous reprenons le raisonnement de [O, lemme 2.2, chapitre 2], en supposant que la conclusion de la proposition est fausse. Alors il existe une suite de k -formes α_p vérifiant

$$\alpha_p \in L_{U_p}^2, \|\alpha_p\|_{L_{U_p}^2} = 1, \alpha_p \perp \mathcal{H}_U^k, \|d\alpha_p\|_{L_{U_p}^2} \leq 1/p, \|\delta_{U_p} \alpha_p\|_{L_{U_p}^2} \leq 1/p.$$

Alors les α_p forment une suite bornée de L_U^2 d'après l'hypothèse (3) (voir la définition 4.1), donc on peut en extraire une sous-suite qui converge faiblement dans L_U^2 vers un élément α ; de plus, l'hypothèse (1) montre que les $(d + \delta_U)(\alpha_p)$ sont bornés sur les compacts, et donc on peut en particulier supposer, d'après le théorème de compacité de Rellich, que les α_p convergent fortement vers α sur le compact K (à une sous-suite près). Mais α est à la fois $(d + \delta_U)$ -harmonique, et orthogonale à $\mathcal{H}_U^k$, donc α est nulle. Or, l'hypothèse (2) entraîne

$$\frac{1}{C_1} - \frac{2}{p^2} \leq \int_K |\alpha_p|^2 dv_{U_p},$$

et en passant à la limite quand p tend vers l'infini, on voit que

$$\frac{1}{C_1} \leq \int_K |\alpha|^2 dv_U,$$

ce qui contredit le fait que α est nulle. $\square$

Avant d'énoncer la prochaine proposition, nous rappelons un résultat d'Hörmander [Ho, théorème 1.1.4] qui nous sera utile. Soient H_i , $i = 1, 2, 3$ trois espaces de Hilbert, de normes $\|\cdot\|_i$ respectivement. On considère deux opérateurs non bornés et fermés $T : H_1 \rightarrow H_2$ et $S : H_2 \rightarrow H_3$ de domaines respectifs $\text{Dom}(T)$ et $\text{Dom}(S)$ denses, et tels que $S \circ T = 0$. On note par T^* l'adjoint de T .

Théorème 4.4 (Hörmander). *Soit F un sous-espace fermé de H_2 qui contient $\text{Im}(T)$. On suppose qu'il existe une constante $c > 0$ telle que*

$$\forall \alpha \in \text{Dom}(T^*) \cap \text{Dom}(S) \cap F, \|\alpha\|_2^2 \leq c [\|T^*\alpha\|_1^2 + \|S\alpha\|_3^2].$$

Alors si $\beta \in \text{Im}(T^)$, il existe $\alpha \in \text{Dom}(T^*)$, avec $T^*\alpha = \beta$ et $\|\alpha\|_2 \leq c^{-1/2}\|\beta\|_1$.*

Nous pouvons maintenant prouver l'analogue du théorème 2.3, chapitre 2 de [O], avec la même méthode.

Proposition 4.5. *On suppose qu'il existe une bonne suite de poids U_p par rapport à U en degré k . Soit $\gamma \in \text{Ker}_{L_U^2}(\text{d})$, de degré $k - 1$. Alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un entier p et un élément $\tilde{\gamma} \in \text{Ker}_{L_{U_p}^2}(\text{d})$, de degré $k - 1$, tels que*

$$\|\tilde{\gamma} - \gamma\|_{L_U^2} < \varepsilon.$$

Démonstration. La conclusion de la proposition signifie que l'espace $\left(\bigcup_{p \geq 1} \text{Ker}_{L_{U_p}^2}(\text{d})\right) \cap L_U^2(\Lambda^{k-1}T^*M)$ est dense dans $\text{Ker}_{L_U^2}(\text{d}) \cap L_U^2(\Lambda^{k-1}T^*M)$. Il suffit donc de prouver que l'orthogonal du premier espace dans le deuxième est nul : soit $\alpha \in \text{Ker}_{L_U^2}(\text{d})$ une forme de degré $k - 1$ telle que

$$\forall p \geq 1, \forall \varphi \in \text{Ker}_{L_{U_p}^2}(\text{d}), \langle \alpha, \varphi \rangle_{L_U^2} = 0.$$

On va montrer que $\alpha = 0$, et pour cela on va montrer qu'il existe une forme β de degré k dans L_U^2 telle que $\alpha = \delta_U \beta$.

D'abord, l'hypothèse (3) montre que pour tout p , la forme linéaire $\langle \alpha, \cdot \rangle_{L_U^2}$ est continue sur $L_{U_p}^2$, de norme inférieure ou égale à $C_2 \|\alpha\|_{L_U^2}$, donc on en déduit l'existence de $\alpha_p \in L_{U_p}^2$ telle que

$$\langle \alpha, \cdot \rangle_{L_U^2} = \langle \alpha_p, \cdot \rangle_{L_{U_p}^2}, \text{ et } \|\alpha_p\|_{L_{U_p}^2} \leq C_2 \|\alpha\|_{L_U^2}.$$

Plus simplement, on a $\alpha_p = e^{U-U_p} \alpha$. D'après l'hypothèse (1), on voit alors que

$$\forall \varphi \in C_0^\infty(\Lambda^k T^* M), \langle \alpha_p, \varphi \rangle_{L_{U_p}^2} \rightarrow \langle \alpha, \varphi \rangle_{L_U^2},$$

puisque pour tout compact fixé, il y a en fait égalité entre α et α_p pour tous les p assez grands.

D'autre part, l'hypothèse d'orthogonalité faite sur α , et la définition des α_p montrent que α_p est orthogonale à $\text{Ker}_{L_{U_p}^2}(\text{d})$ dans $L_{U_p}^2$, donc est dans l'adhérence de l'image de δ_{U_p} . Or, cette image est fermée grâce aux inégalités de Poincaré à l'infini (2), par un raisonnement proche de celui de la preuve de la proposition 1.3 : supposons en effet qu'il existe une suite ψ_l de k -formes de $L_{U_p}^2$ telle que la suite $\delta_{U_p} \psi_l$ soit dans $L_{U_p}^2$, et converge dans cet espace vers une $(k-1)$ -forme ω . L'inégalité de Poincaré à l'infini montre que 0 n'est pas dans le spectre essentiel du laplacien $\Delta_{U_p, k}$ agissant sur les k -formes (où $\Delta_{U_p} = (d + \delta_{U_p})^2$), donc on a un opérateur de Green G comme dans la proposition 1.2. Quitte à remplacer ψ_l par $dG_- \psi_l$, on peut supposer que les ψ_l sont exactes. On utilise alors encore une fois l'hypothèse sur le spectre essentiel pour en déduire l'existence d'une constante $C > 0$ telle que

$$\forall \psi \in \text{Dom}((d + \delta_{U_p})_k), \psi \perp \text{Ker}(\Delta_{U_p, k}), C \|\psi\|_{L_{U_p}^2}^2 \leq \|d\psi\|_{L_{U_p}^2}^2 + \|\delta_{U_p} \psi\|_{L_{U_p}^2}^2.$$

On en déduit facilement que ψ_l est une suite de Cauchy dans $L_{U_p}^2$, et qu'elle converge vers un élément ψ , avec $\delta_{U_p} \psi = \omega$. Ceci finit de montrer que l'image de δ_{U_p} est fermée dans $L_{U_p}^2$. On a donc

$$\alpha_p \in \text{Im}(\delta_{U_p}).$$

On va appliquer le théorème d'Hörmander 4.4 avec $H_i = L_{U_p}^2(\Lambda^{k+i-2} T^* M)$, $i = 1, 2, 3$, $T = S = d$, et F l'ensemble des k -formes de $L_{U_p}^2$ qui sont orthogonales à $\mathcal{H}_U^k$ dans $L_U^2(\Lambda^k T^* M)$. F est clairement fermé, et de plus il contient l'image de $T = d$: en effet, soient ξ un élément de $\mathcal{H}_U^k$, et $\gamma = T\eta = d\eta \in L_{U_p}^2(\Lambda^k T^* M) \subset L_U^2(\Lambda^k T^* M)$ un élément de $\text{Im}(T)$, avec $\eta \in L_{U_p}^2(\Lambda^{k-1} T^* M) \subset L_U^2(\Lambda^{k-1} T^* M)$. Alors on a :

$$\begin{aligned} \langle \xi, \gamma \rangle_{L_U^2} &= \langle \xi, d\eta \rangle_{L_U^2} \\ &= \langle \delta_U \xi, \eta \rangle_{L_U^2} = 0, \end{aligned}$$

l'intégration par parties qui fait passer de la première ligne à la deuxième étant justifiée car (M, g) est complète. On a donc bien $\text{Im}(T) \subset F$. Enfin, l'estimation dont on a besoin pour appliquer le théorème d'Hörmander est obtenue dans la proposition 4.3, avec la même constante $c = C_3$ pour tous les p assez grands. Ceci montre l'existence d'une constante C_4 et, pour tout p , d'une forme β_p de $L^2_{U_p}$ telles que

$$\delta_{U_p}\beta_p = \alpha_p, \text{ et } \|\beta_p\|_{L^2_{U_p}} \leq C_4\|\alpha_p\|_{L^2_{U_p}}.$$

Il est alors facile de voir que les β_p sont bornées dans L^2_U (par $C_2^2 C_4 \|\alpha\|_{L^2_U}$), donc que les β_p convergent (à une sous-suite près, notée encore β_p) faiblement vers une forme β dans L^2_U . De plus, on a $\delta_U\beta = \alpha$: en effet, pour toute forme φ lisse à support compact, et pour tout p assez grand (dépendant du support de φ), on a d'après (1)

$$\langle \beta_p, d\varphi \rangle_{L^2_{U_p}} = \langle \beta_p, d\varphi \rangle_{L^2_U}.$$

Le membre de droite de cette égalité tend vers $\langle \beta, d\varphi \rangle_{L^2_U}$ par convergence faible. Quant au membre de gauche, on a

$$\langle \beta_p, d\varphi \rangle_{L^2_{U_p}} = \langle \delta_{U_p}\beta, \varphi \rangle_{L^2_{U_p}} = \langle \alpha_p, \varphi \rangle_{L^2_{U_p}} = \langle \alpha, \varphi \rangle_{L^2_U}.$$

Ceci achève la preuve de la proposition. $\square$

Démonstration du théorème 4.2. Grâce à (1) et (2), l'opérateur $(d + \delta_U)$ vérifie aussi une inégalité de Poincaré à l'infini, donc $H^k_{2,U}(M)$ est de dimension finie. Il suffit donc de montrer que pour p assez grand, l'application $H^k_{2,U_p}(M) \rightarrow H^k_{2,U}(M)$ est injective et d'image dense, et ces deux faits découlent des deux propositions précédentes. $\square$

5 L^2 -cohomologie des variétés de volume fini, à courbure négative pincée

5.1 Théorème principal

Dans cette partie, (M^n, g) est une variété riemannienne complète de dimension n , de volume fini, à courbure sectionnelle K négative pincée : il existe des constantes a et b , telles que l'on ait $-b^2 \leq K \leq -a^2 < 0$. Dans la troisième partie (corollaire 3.2), on a donné une interprétation topologique des espaces de L^2 -cohomologie à poids de ces variétés, si le poids est bien choisi. Ici, nous allons comparer les espaces de L^2 -cohomologie aux espaces de L^2 -cohomologie à poids, grâce aux résultats de la partie précédente. Des travaux d'Ohsawa, on déduit d'abord la proposition suivante :

Proposition 5.1. *Soit (M^n, g) , une variété riemannienne complète de dimension n , de volume fini, à courbure sectionnelle K négative pincée : il*

existe des constantes a et b , telles que l'on ait $-b^2 \leq K \leq -a^2 < 0$. On suppose que pour un entier $k < (n-1)/2$, on a $(n-1-k)a - kb =: \varepsilon > 0$. Alors on a l'isomorphisme:

$$H_2^{n-k}(M) \simeq H_c^{n-k}(M).$$

Démonstration. On va appliquer le théorème 4.2 avec une suite de poids bien choisis. Fixons d'abord une constante $C > 0$ qu'on choisira ensuite assez grande, et considérons une fonction $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 qui vérifie

$$F(t) = 0 \quad \text{si } t \leq 0,$$

$$F(t) = Ct \quad \text{si } t \geq 1,$$

$$F' \geq 0.$$

On peut, sans perdre de généralités, supposer que M a un seul bout, et on note par r une fonction de Busemann associée. On considère alors une suite $U_p : M \rightarrow \mathbb{R}$ de fonctions de classe C^2 définies en $x \in M$ par

$$U_p(x) = F(r(x) - p).$$

Si x est fixé dans M , pour p assez grand, on a $U_p(x) = 0$, c'est-à-dire que l'hypothèse (1) de la définition 4.1 est vérifiée par $U \equiv 0$ et la suite U_p . L'hypothèse (3) est aussi facile à vérifier avec $C_2 = 1$. Nous allons voir que la condition (2) est aussi satisfaite en degrés $n-k$ et $n-k+1$. En effet, d'après la formule d'intégration par parties du corollaire 2.3, en prenant $f = r$, si α est une forme à support compact contenu dans le bout, on a

$$\begin{aligned} \int_M [2Hr(\alpha, \alpha) + \Delta r |\alpha|^2 - F'(r-p) |\alpha|^2] dv_{U_p} = \\ 2 \int_M [\langle i_{\nabla r} d\alpha, \alpha \rangle + \langle i_{\nabla r} \alpha, \delta_{U_p} \alpha \rangle] dv_{U_p}. \end{aligned} \quad (5.5)$$

Notons $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ les valeurs propres du hessien Hr . D'après l'hypothèse sur les courbures sectionnelles, le théorème de comparaison des hessiens de Greene et Wu [G-W] nous donne $\lambda_1 = 0$, et $-b \leq \lambda_i \leq -a$, $i \geq 2$ sur le bout. Ainsi, en raisonnant comme dans [B-B, corollaire 5.4], si α est de degré $n-k$, on a

$$2Hr(\alpha, \alpha) + \Delta r |\alpha|^2 \leq -[(n-k-1)a - kb] |\alpha|^2 = -\varepsilon |\alpha|^2.$$

Cette inégalité reste *a fortiori* vraie si α est de degré $n-k+1$. Comme on a $F' \geq 0$, on déduit de la formule d'intégration par parties 5.5 que pour toute $(n-k)$ ou $(n-k+1)$ -forme α à support dans le bout :

$$\sqrt{\varepsilon} \|\alpha\|_{L_{U_p}^2} \leq 2 \left[\|d\alpha\|_{L_{U_p}^2} + \|\delta_{U_p} \alpha\|_{L_{U_p}^2} \right].$$

Ceci montre que l'hypothèse (2) de la définition 4.1 est aussi vérifiée pour les degrés $n - k$ et $n - k + 1$. Par conséquent, la suite U_p est une bonne suite de poids pour $U \equiv 0$ en degrés $n - k$ et $n - k + 1$, donc d'après le théorème d'Ohsawa 4.2, pour p assez grand, on a

$$H_{2,U_p}^{n-k}(M) \simeq H_2^{n-k}(M).$$

Or, si on est assez loin sur le bout, la fonction U_p est égale à Cr , et par le corollaire 3.2, on sait dans ce cas que si la constante C est assez grande, alors

$$H_{2,U_p}^*(M) \simeq H_c^*(M).$$

Ceci achève la preuve de la proposition. $\square$

Remarque. L'hypothèse $(n - 1 - k)a - kb > 0$ est exactement celle qui permet de savoir que 0 n'est pas dans le spectre essentiel du laplacien Δ_k (voir [Do-X, théorème 4.2] et [B-B, corollaire 5.4]). On verra que le résultat de la proposition 5.1 est optimal par rapport au pincement.

Nous pouvons maintenant énoncer notre résultat principal.

Théorème 5.2. *Soit (M^n, g) , une variété riemannienne complète de dimension n , de volume fini, à courbure sectionnelle K négative pincée : il existe des constantes a et b , telles que l'on ait $-b^2 \leq K \leq -a^2 < 0$. On suppose que $na - (n - 2)b > 0$, alors on a les isomorphismes entre espaces vectoriels de dimension finie :*

$$H_2^k(M) \simeq \begin{cases} H^k(M), & \text{si } k < (n - 1)/2, \\ \text{Im}(H_c^{n/2}(M) \rightarrow H^{n/2}(M)), & \text{si } k = n/2, \\ H_c^k(M), & \text{si } k > (n + 1)/2. \end{cases}$$

Si de plus la courbure est constante ($a = b$), et la dimension est impaire, alors on a $H_2^{(n\pm 1)/2}(M) \simeq \text{Im}(H_c^{(n\pm 1)/2}(M) \rightarrow H^{(n\pm 1)/2}(M))$

Démonstration. On peut tout d'abord supposer que M est orientable. Sinon, il suffit de considérer le revêtement à deux feuillets $\tilde{M}$ qui, lui, est orientable, en remarquant que si τ est l'automorphisme du revêtement, alors la L^2 -cohomologie de M est isomorphe à la L^2 -cohomologie τ -invariante de $\tilde{M}$. L'avantage qu'on en tire est que sur une variété orientable, l'opérateur $*$ de Hodge réalise une isométrie entre les k et les $(n - k)$ -formes harmoniques. Ainsi, on peut se limiter aux degrés k supérieurs ou égaux à $n/2$.

1. Pour les degrés $k > (n + 1)/2$, la conclusion du théorème découle de la proposition 5.1
2. Supposons que $n = 2m$, et traitons le cas $k = n/2 = m$. On sait que, sous nos hypothèses de courbure, 0 n'est pas dans le spectre essentiel du laplacien agissant sur les formes [B-B]. Les deux suites exactes de

la première partie (corollaire 1.4) sont donc vraies pour tous les degrés, et en particulier, pour tout ouvert borné D , on a :

$$H_c^m(D) \rightarrow H_2^m(M) \rightarrow H_2^m(M \setminus D),$$

et

$$H_2^m(M \setminus D, \partial D) \rightarrow H_2^m(M) \rightarrow H^m(D).$$

Sans perdre de généralités, on peut supposer que M a un seul bout, et on note par r une fonction de Busemann associée. On prend alors $D = \{r < c\}$ pour un réel c fixé, et on va montrer que $H_2^m(M \setminus D) = H_2^m(M \setminus D, \partial D) = 0$, si on choisit c assez grand. Alors les deux suites exactes ci-dessus donneront : $H_c^m(M)$ se surjecte dans $H_2^m(M)$, et $H_2^m(M)$ s'injecte dans $H^m(M)$. Mais d'après Anderson [An] (voir aussi [L1] ou [C4]), $\text{Im}(H_c^m(M) \rightarrow H^m(M))$ s'injecte toujours dans $H_2^m(M)$, donc on en déduira que $H_2^m(M) \simeq \text{Im}(H_c^m(M) \rightarrow H^m(M))$.

Il nous reste donc à montrer que $H_2^m(M \setminus D) = H_2^m(M \setminus D, \partial D) = 0$. Pour cela, on considère la variété double $X_c = (M \setminus D) \# (-M \setminus D)$ obtenue en recollant deux copies de $M \setminus D$ le long de ∂D . X_c porte une métrique naturelle qui coïncide avec celle de $M \setminus D$ sur chacune des copies. Cette métrique n'est pas lisse, mais seulement lipschitzienne ; cependant, ceci est suffisant pour définir l'opérateur δ et toute l'analyse précédente reste valable. La L^2 -cohomologie de X_c vérifie alors (voir par exemple [C1])

$$H_2^*(X_c) = H_2^*(M \setminus D) \oplus H_2^*(M \setminus D, \partial D).$$

Il nous suffit donc de montrer que $H_2^m(X_c) = 0$. D'après la première partie de la démonstration, on sait déjà que

$$H_2^k(X_c) \simeq \begin{cases} H^k(X_c), & \text{si } k < m, \\ H_c^k(X_c), & \text{si } k > m. \end{cases}$$

X_c est difféomorphe à un produit $\mathbb{R} \times \partial D$, donc ses nombres de Betti $b_k(X_c)$ sont les mêmes que ceux de ∂D . La caractéristique d'Euler L^2 de X_c est par conséquent donnée par

$$\chi_2(X_c) = 2 \sum_{k < m} (-1)^k b_k(\partial D) + (-1)^m \dim(H_2^m(X_c)),$$

où $b_k(\partial D)$ est le k -ème nombre de Betti de ∂D . Or, d'après [B-B, théorème C], on a :

$$\chi_2(X_c) = \int_{X_c} \omega + 2 \int_{\partial D} P(II) + 2 \sum_{k < m} (-1)^k b_k(\partial D),$$

où ω est la forme d'Euler, et $P(II)$ est un polynôme en la courbure et en la seconde forme fondamentale de ∂D . On en déduit donc que :

$$(-1)^m \dim(H_2^m(X_c)) = \int_{X_c} \omega + 2 \int_{\partial D} P(II).$$

Mais le terme de droite de cette égalité tend vers zéro lorsque c tend vers l'infini, donc le terme de gauche, qui est un entier, est nul pour c assez grand ; on obtient bien l'annulation souhaitée.

3. Il ne nous reste plus qu'à considérer le cas où la courbure est constante (par exemple égale à -1), $n = 2m + 1$ est impair, $k = (n - 1)/2 = m$. On peut toujours supposer qu'on a un seul bout, et donc qu'en dehors d'un ouvert D , $M \setminus D$ est de la forme $]0, \infty[\times \partial D$, portant la métrique

$$dr^2 + e^{-2r} d\theta^2,$$

où r est une fonction de Busemann, et $d\theta^2$ est une métrique sur la variété ∂D . D'après [Do-X], 0 n'est pas dans le spectre essentiel du laplacien en degré $m - 1$. Donc d'après les résultats de la première partie, on a les deux suites exactes

$$H_c^m(D) \rightarrow H_2^m(M) \rightarrow H_2^m(M \setminus D),$$

$$H_2^m(M \setminus D, \partial D) \rightarrow H_2^m(M) \rightarrow H^m(D).$$

De nouveau, il nous suffit de montrer l'annulation de la L^2 -cohomologie à l'infini. On va procéder comme dans la démonstration de [C4, lemme 5.3]. D'abord, $]0, \infty[\times \partial D$ est finiment recouvert par $]0, \infty[\times \mathbb{T}^{n-1}$, avec $\mathbb{T}^{n-1}$ un tore plat. Il suffit donc de montrer le résultat pour $]0, \infty[\times \mathbb{T}^{n-1}$. Comme le tore $\mathbb{T}^{n-1}$ agit par isométries sur $]0, \infty[\times \mathbb{T}^{n-1}$, et que cette action engendre des vecteurs de Killing de longueur bornée, [Hi, théorème 3] montre que toute forme harmonique L^2 vérifiant la condition absolue ou relative est invariante sous cette action. Ainsi, si α est une telle m -forme, on peut écrire $\alpha = \beta(r) + dr \wedge \gamma(r)$, où $\beta(r)$ et $\gamma(r)$ sont vues comme des formes définies sur $\mathbb{T}^{n-1}$, dépendant du paramètre r , et on a :

$$d\alpha = dr \wedge \frac{\partial \beta}{\partial r} = 0,$$

$$\delta\alpha = -\frac{\partial \gamma}{\partial r} + 2\gamma = 0,$$

donc si α vérifie la condition absolue $\gamma(0) = 0$, on obtient finalement $\alpha = \beta(0)$. Mais cette forme n'est de carré intégrable que si elle est nulle. De même, si α vérifie la condition relative, α est forcément nulle.

□

Remarques.

- i) Pour les variétés hyperboliques de volume fini, on retrouve les résultats de Zucker [Z], et de Mazzeo et Phillips [M-P] concernant la L^2 -cohomologie (ces deux derniers auteurs traitent le cas plus général des variétés hyperboliques géométriquement finies).
- ii) Les résultats précédents, et tous ceux qui suivent, restent vrais si on perturbe la métrique sur un compact.
- iii) Pour avoir la conclusion seulement pour les degrés inférieurs ou égaux à un $k < (n - 1)/2$, il suffit d'avoir $(n - k - 1)a - kb > 0$ (voir la proposition 5.1. Mieux encore, il suffit d'imposer ces conditions de pincement uniquement sur les courbures radiales, car ce sont celles qui interviennent dans le théorème de comparaison des hessiens de Greene et Wu.
- iv) Les degrés $k = (n \pm 1)/2$ quand $n = 2m + 1$ est impair et la courbure variable ne sont pas pris en compte : on verra en effet à la fin de cette partie un exemple montrant qu'on ne peut pas espérer de résultats analogues pour ces degrés dès que la courbure varie.
- v) Si la courbure est constante, et si la dimension est paire, ou bien si on est en dimension deux, l'annulation de la L^2 -cohomologie à l'infini en degré moitié s'obtient de manière plus simple, par invariance conforme de la L^2 -cohomologie en ce degré : dans ce cas, chaque bout est conformément équivalent à un cylindre, et il est bien connu que la L^2 -cohomologie d'un cylindre est nulle.

5.2 Etude d'un exemple : le produit doublement tordu

On va maintenant étudier une famille d'exemples qui montre que la conclusion du théorème est fausse, d'une part pour les degrés proches du degré moitié si la dimension est impaire, dès que la courbure varie, et d'autre part pour tous les degrés (autres que 0 et n) si la courbure n'est pas assez pincée. Considérons le tore $\mathbb{T}^i$ de dimension i , notons h_i la métrique induite par celle de $\mathbb{R}^i$. Soient $n \geq 3$ un entier, $1 \leq k < n - 1$ un autre entier, et $0 < a < b$ deux réels. On munit la variété $\Omega =]0, \infty[\times \mathbb{T}^{n-k-1} \times \mathbb{T}^k$ de la métrique

$$g = dr^2 + e^{-2ar} h_{n-k-1} + e^{-2br} h_k.$$

Ballmann et Brüning ont considéré cet exemple [B-B, exemples 3.19, 4.2 et 5.5]. Ils montrent notamment que la courbure sectionnelle K vérifie $-b^2 \leq K \leq -a^2$, et que 0 est dans le spectre essentiel du laplacien Δ_k si et seulement si $(n - k - 1)a - kb = 0$.

Nous allons déterminer l'espace des p -formes harmoniques sur (Ω, g) , en raisonnant comme dans [C4, lemme 5.3] et comme à la fin de la démonstration du théorème précédent. Tout d'abord, si α est une p -forme harmonique vérifiant la condition absolue ou relative sur le bord $\{0\} \times \mathbb{T}^{n-k-1} \times \mathbb{T}^k$, alors d'après le résultat de Hitchin [Hi, théorème 3], α est invariante sous l'action de $\mathbb{T}^{n-k-1} \times \mathbb{T}^k$. Si $x_1, \dots, x_{n-k-1}, y_1, \dots, y_k$ est un système de coordonnées sur $\mathbb{T}^{n-1} = \mathbb{T}^{n-k-1} \times \mathbb{T}^k$, on peut écrire

$$\alpha = \sum_{I,J} a_{I,J}(r) dx^I \wedge dy^J + dr \wedge \sum_{I,J} b_{I,J}(r) dx^I \wedge dy^J,$$

où $I = (i_1, \dots, i_l)$ et $J = (j_1, \dots, j_m)$ sont des multi-indices, avec $l + m = p$ pour la première somme et $l + m = p - 1$ pour la deuxième, $l \leq n - k - 1$, $m \leq k$, $dx^I \wedge dy^J = dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_l} \wedge dy^{j_1} \wedge \dots \wedge dy^{j_m}$, et enfin où $a_{I,J}(r)$, $b_{I,J}(r)$ sont des fonctions qui ne dépendent que de r . On peut réécrire cette formule sous la forme :

$$\alpha = \sum_I \beta_I(r) + \sum_I dr \wedge \gamma_I(r),$$

où chaque multi-indice $I = (i_1, \dots, i_l, j_1, \dots, j_m)$ est de longueur $l_I + m_I = p$ (respectivement $l_I + m_I = p - 1$) dans la première somme (respectivement dans la deuxième somme). On a alors :

$$0 = d\alpha = dr \wedge \sum_I \frac{\partial \beta_I}{\partial r},$$

$$0 = \delta\alpha = - \sum_I \left[\frac{\partial \gamma_I}{\partial r} + (2(l_I a + m_I b) - (n - k - 1)a - kb) \gamma_I \right].$$

Si α vérifie la condition absolue au bord, on a donc forcément

$$\alpha = \sum_I \beta_I,$$

avec les β_I indépendantes de r . Chaque β_I étant de carré intégrable si et seulement si $2(l_I a + m_I b) < (n - k - 1)a + kb$, on en déduit finalement :

$$\begin{aligned} \dim(H_2^p(\Omega)) &= \# \{ I = (i_1, \dots, i_l, j_1, \dots, j_m) / l \leq n - k - 1, m \leq k, \\ &\quad l + m = p \text{ et } 2(la + mb) < (n - k - 1)a + kb \}, \end{aligned} \quad (5.6)$$

et comme par dualité $H_2^p(\Omega, \partial\Omega) \simeq H_2^{n-p}(\Omega)$,

$$\begin{aligned} \dim(H_2^p(\Omega, \partial\Omega)) &= \# \{ I = (i_1, \dots, i_l, j_1, \dots, j_m) / l \leq n - k - 1, m \leq k, \\ &\quad l + m = n - p \text{ et } 2(la + mb) < (n - k - 1)a + kb \}. \end{aligned}$$

On peut alors voir qu'en dimension impaire $n = 2s + 1$, la conclusion du théorème 5.2 concernant les variétés hyperboliques de volume fini n'est plus vérifiée en courbure variable pour les degrés s et $s + 1$. Considérons en effet le double produit tordu $\Omega =]0, \infty[\times \mathbb{T}^s \times \mathbb{T}^s$ muni de la métrique $g = dr^2 + e^{-2ar} h_s + e^{-2br} h_s$. L'équation 5.6 qui donne la dimension de $H_2^s(\Omega)$ montre que cette dimension n'est jamais nulle, dès que b est strictement plus grand que a : le multi-indice qui a des 1 pour s premières composantes et des 0 ailleurs est par exemple toujours solution dans ce cas. Ainsi, sur la variété double $\Omega_\#(-\Omega)$, de dimension $2s + 1$, il y a au moins une s -forme harmonique en degré s , car $H_2^s(\Omega_\#(-\Omega)) = H_2^s(\Omega) \oplus H_2^s(\Omega, \partial\Omega)$. Mais l'image de la cohomologie relative dans la cohomologie est nulle.

Ensuite, nous nous contentons, pour simplifier, de considérer le cas $n = 4$. Le cas général est similaire, et n'apporte rien de plus. Avec les notations précédentes, nous choisissons $k = 1$, et nous pouvons supposer que $b = 1$. L'égalité 5.6 montre que la L^2 -cohomologie absolue de degré un $H_2^1(\Omega)$ est de dimension 2 ou 3 selon les valeurs de a : les formes dx_1 et dx_2 sont toujours dans $H_2^1(\Omega)$ et non nulles, alors que dy_1 n'est solution que si $a > 1/2$. Quant à la L^2 -cohomologie relative, elle est toujours nulle. Comme la cohomologie usuelle de degré 1 de $\Omega_\#(-\Omega) = \mathbb{R} \times \mathbb{T}^3$ est de dimension 3, l'isomorphisme $H^1(\Omega_\#(-\Omega)) \simeq H_2^1(\Omega_\#(-\Omega))$ n'est vrai que si $a > 1/2$. Remarquons que $a = 1/2$ est exactement la valeur pour laquelle 0 est dans le spectre essentiel de Δ_1 . De même, on voit qu'en degré 2, l'isomorphisme entre la L^2 -cohomologie et l'image de la cohomologie à support compact dans la cohomologie n'est vrai que si $a > 1/2$.

6 Quelques autres géométries

6.1 Certains produits tordus

On considère ici des variétés dont chacun des bouts est isométrique à une variété de la forme $B =]0, \infty[\times K$ (avec K une variété compacte sans bord) munie d'une métrique qui s'écrit

$$dr^2 + F(r)^2 d\theta^2,$$

où F est une fonction strictement positive, et $d\theta^2$ est une métrique sur K . Les formes harmoniques de telles variétés ont par exemple été étudiées dans [D], [Br] et [C2], où les auteurs obtiennent des résultats d'annulation et de finitude.

Nous allons donner une interprétation topologique de ces espaces dans certains cas particuliers. Dans un repère orthonormal local $e_1 = \nabla r, e_2, \dots, e_n$ de B (avec $e_2, \dots, e_n$ un repère orthogonal de K pour la métrique $d\theta^2$), le hessien de la fonction r se diagonalise : il vaut zéro sur $e_1 = \nabla r$, et F'/F

sur les autres vecteurs. Ainsi, si α est une k -forme, on a :

$$2Hr(\alpha, \alpha) + \Delta r|\alpha|^2 = \frac{F'}{F}[(2k - (n - 1))|\alpha|^2 - 2|i_{\nabla r}\alpha|^2].$$

Si on suppose que $F'/F \geq C > 0$ pour une constante C , alors en utilisant la double inégalité $0 \leq |i_{\nabla r}\alpha|^2 \leq |\alpha|^2$, on obtient

$$\begin{aligned} 2Hr(\alpha, \alpha) + \Delta r|\alpha|^2 &\geq C[2k - 2 - (n - 1)]|\alpha|^2, \\ 2Hr(\alpha, \alpha) + \Delta r|\alpha|^2 &\leq C[2k - (n - 1)]|\alpha|^2. \end{aligned}$$

On peut aussi faire un raisonnement analogue si on suppose que $F'/F \leq -C < 0$. Ainsi, les méthodes des paragraphes précédents permettent d'affirmer :

Théorème 6.1. *Soit (M^n, g) une variété riemannienne. On suppose que M se décompose en $D \cup_i B_i$ où D est une variété compacte à bord, et chaque bout B_i est isométrique à un produit tordu de la forme $]0, \infty[\times K_i$ portant la métrique $dr^2 + F_i^2(r)d\theta_i^2$.*

a) *S'il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout i on ait $F'_i/F_i > C$, alors*

$$H_2^k(M) \simeq \begin{cases} H_c^k(M), & \text{si } k \leq (n - 1)/2, \\ H^k(M), & \text{si } k \geq (n + 1)/2. \end{cases}$$

b) *S'il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout i on ait $F'_i/F_i < -C$, alors*

$$H_2^k(M) \simeq \begin{cases} H^k(M), & \text{si } k < (n - 1)/2, \\ \text{Im}(H_c^k(M) \rightarrow H^k(M)), & \text{si } k = n/2 \\ H_c^k(M), & \text{si } k > (n + 1)/2. \end{cases}$$

Démonstration. On fait la démonstration par exemple uniquement pour le cas b). Par dualité, il suffit de considérer les degrés $k \leq n/2$. Pour $k < (n - 3)/2$, on raisonne comme dans la preuve du théorème 3.1 : les estimées sur le hessien des fonctions F_i montrent qu'on a une inégalité de Poincaré à l'infini pour $k < (n - 1)/2$, donc on a une suite exacte comme dans le corollaire 1.4. Les mêmes estimées montrent que pour $k < (n - 1)/2$, la L^2 -cohomologie relative à l'infini est nulle, ce qui donne bien les isomorphismes souhaités pour $k < (n - 3)/2$.

Maintenant, on traite par exemple le cas où $n = 2m$ est pair, et où $k = (n - 2)/2 = m - 1$ (le degré $k = (n - 3)/2$ lorsque n est impair se traite de façon similaire). On pourra supposer, pour simplifier, qu'on a un seul bout. D'après ce qui précède, on a une injection

$$0 \rightarrow H_2^{m-1}(M) \xrightarrow{r} H^{m-1}(D).$$

On va montrer que cette application est surjective. Soit donc $[\alpha]$ une classe de $H^{m-1}(D)$. Près de ∂D , on écrit $\alpha = \beta(r) + dr \wedge \gamma(r)$, où $\beta(r)$ et $\gamma(r)$ sont considérées comme des formes sur ∂D , dépendant du paramètre r . On pose

$$\varphi(r) = \int_0^r \gamma(t) dt,$$

et on voit facilement que $\alpha - d\varphi$ ne contient pas de composante suivant dr . De plus, si d^T désigne la différentielle sur ∂D , on a

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial r}(\alpha - d\varphi) &= \frac{\partial \beta}{\partial r} - d^T \gamma \\ &= d\alpha = 0. \end{aligned}$$

Donc quitte à remplacer α par $\alpha - d\varphi$, on pourra supposer que près de ∂D , α est indépendante de r , et sans composante normale. Comme l'extérieur de D est diffeomorphe à un cylindre $]0, \infty[\times \partial D$, on peut prolonger α en dehors de D par $\alpha(r) = \alpha(0)$ pour $r \geq 0$. Ce prolongement, noté $\tilde{\alpha}$, reste fermé. De plus, on voit facilement qu'il est de carré intégrable, donc $r[\tilde{\alpha}] = [\alpha]$, et r est bien surjective.

Pour le degré $n/2$, on utilise l'invariance conforme de la L^2 -cohomologie en degré moitié : dans ce cas, chaque bout est conformément équivalent à un cylindre, et la L^2 -cohomologie d'un cylindre est nulle. On finit ensuite comme dans le point 2. de la preuve du théorème 5.2. $\square$

Remarque. Si dans la formule d'intégration par parties, on choisit une fonction de la forme $f(r)$, avec $f' = F$, alors on a

$$2Hf(\alpha, \alpha) + \Delta f |\alpha|^2 = F'(2k - n) |\alpha|^2.$$

Alors pour toute forme à support compact, le corollaire 2.2 donne :

$$\left| \int (2k - n) F' |\alpha|^2 \right| \leq 2 \sup_{\text{support}(\alpha)} (F(r)) [\|d\alpha\|_{L^2} + \|\delta\alpha\|_{L^2}] \|\alpha\|_{L^2}.$$

Si on suppose que F' est de signe constant (sans s'annuler) et que F est bornée, ceci montre que pour $k \neq n/2$, l'opérateur $d + \delta$ est non parabolique à l'infini en restriction aux k -formes, et donc que les espaces de formes harmoniques qui correspondent sont de dimension finie (voir [C3]). En toute rigueur, le résultat de [C3] ne s'applique que si l'opérateur $d + \delta$ est non parabolique à l'infini globalement, c'est-à-dire sur tous les degrés. Cependant, la même preuve s'adapte à notre cas. Remarquons aussi que dans [C2], G. Carron obtient un meilleur résultat si f est concave ($F' < 0$) : dans ce cas, et sans autre hypothèse sur F , l'opérateur $d + \delta$ est non-parabolique à l'infini (voir la remarque qui suit [C2, proposition 5.1]).

6.2 Application aux variétés conformément compactes

Dans cette partie, nous considérons une variété riemannienne $\overline{M}^n$ compacte à bord, de dimension n , munie d'une métrique riemannienne $\overline{g}$ qui est lisse jusqu'au bord. Soit $y : \overline{M} \rightarrow \mathbf{R}_+$ une fonction lisse et positive définissant le bord : $\partial M = y^{-1}(0)$, et $dy \neq 0$ le long de ∂M . On munit M de la métrique $g = \overline{g}/y^2$; cette métrique est complète et on dit que $\overline{M}$ est une variété conformément compacte. Si de plus la norme de dy par rapport à $\overline{g}$ est constante le long du bord, on dira que M est asymptotiquement hyperbolique. L'exemple typique d'une telle situation est donnée par le modèle du disque hyperbolique, où $\overline{g}$ est la métrique euclidienne, et $y(x) = (1 - |x|^2)/2$. Dans [M], Mazzeo relie la L^2 -cohomologie de M en degrés $k < (n - 1)/2$ (respectivement $k > (n + 1)/2$) à la cohomologie relative (respectivement absolue) de $\overline{M}$. De plus, il détermine complètement le spectre essentiel du laplacien pour tous les degrés. Pour ceci, l'auteur utilise des outils de calcul pseudo-différentiel adaptés à la géométrie considérée. Ici, nous allons voir comment le théorème 6.1 permet de retrouver plus simplement le résultat de Mazzeo concernant la L^2 -cohomologie :

Corollaire 6.2 (Mazzeo). *Soit (M^n, g) une variété conformément compacte. Alors on a les isomorphismes entre espaces vectoriels de dimension finie :*

$$H_2^k(M) \simeq \begin{cases} H_c^k(M), & \text{si } k \leq (n - 1)/2, \\ H^k(M), & \text{si } k \geq (n + 1)/2. \end{cases}$$

Démonstration. On va montrer (et c'est certainement bien connu) qu'à l'infini, M est quasi-isométrique à un produit tordu $[0, \infty[\times \partial M$ portant la métrique $dr^2 + e^{2r} d\theta^2$ (ici, je remercie encore une fois G. Carron de m'avoir expliqué ce fait). Comme la L^2 -cohomologie est invariante par quasi-isométries, on aura le résultat grâce au théorème 6.1. D'abord, remarquons que si $\tilde{g}$ et $\tilde{y}$ sont respectivement une autre métrique sur $\overline{M}$ et une autre fonction définissant le bord, alors les métriques $\overline{g}/y^2$ et $\tilde{g}/\tilde{y}^2$, sont quasi-isométriques. En effet, les métriques $\overline{g}$ et $\tilde{g}$ étant définies sur $\overline{M}$ qui est compacte, elles sont comparables, et comme y et $\tilde{y}$ s'annulent exactement sur ∂M à l'ordre zéro, y et $\tilde{y}$ sont aussi comparables, et $\overline{g}/y^2$ et $\tilde{g}/\tilde{y}^2$ sont bien quasi-isométriques. Ensuite, si $\overline{g}$ est une métrique donnée, on peut toujours choisir y de sorte que la norme de dy par rapport à $\overline{g}$ le long du bord ∂M soit constante : on note $a(\theta)$ cette norme (θ est la variable sur ∂M), et on peut remplacer y par y/a sur un voisinage de ∂M . On a alors $d(y/a) = dy/a + yd(1/a) = dy/a$ sur ∂M . En résumé, on peut supposer que notre métrique conformément compacte est asymptotiquement hyperbolique. Mais pour une telle métrique, la quasi-isométrie avec le produit tordu souhaité découle par exemple des travaux de Graham (voir [Gr]).

□

References

- [A-S] Z. Ahmed et D. W. Stroock, *A Hodge theory for some non-compact manifolds*, J. Differential Geom., **54** n°1 (2000), 177-225.
- [An] M. Anderson, *L^2 harmonic forms on complete Riemannian manifolds*, Geometry and Analysis on Manifolds (Katata/Kyoto, 1987), Lecture Notes in Math., n° **1339**, 1-19.
- [Ang] N. Anghel, *An abstract index theorem on non-compact Riemannian manifolds*, Houston J. Math., **19** n°2 (1993), 223-237.
- [B-B] W. Ballmann, J. Brüning, *On the spectral theory of manifolds with cusps*, J. Math. Pures Appl., **80** n°6 (2001), 593-625.
- [Ba] C. Bär, *The Dirac operator on hyperbolic manifolds of finite volume*, J. Differential Geom., **54** n°3 (2000), 439-488.
- [Be] A.L. Besse, *Einstein manifolds*, Springer Verlag, New York, Berlin, Heidelberg, 1987.
- [Br] J. Brüning, *L^2 -index theorems on certain complete manifolds*, J. Differential Geom., **32** (1990), 491-532.
- [C1] G. Carron, *Une suite exacte en L^2 -cohomologie*, Duke Math. J., **95** n°2 (1998), 343-372.
- [C2] G. Carron, *Théorèmes de l'indice sur les variétés non-compactes*, J. Reine Angew. Math., **541** (2001), 81-115.
- [C3] G. Carron, *Un théorème de l'indice relatif*, Pacific J. Math., **198** n°1 (2001), 81-107.
- [C4] G. Carron, *L^2 -cohomology of manifolds with flat ends*, prépublication (2001).
- [D] J. Dodziuk, *L^2 harmonic forms on rotationally symmetric Riemannian manifolds*, Proc. Amer. Math. Soc., **77** (1979), 395-400.
- [Do] H. Donnelly, *On the essential spectrum of a complete Riemannian manifold*, Topology, **20** n°1 (1981), 1-14.
- [Do-F] H. Donnelly, Ch. Fefferman, *L^2 -cohomology and index theorem for the Bergman metric*, Annals of math., **118** (1983), 593-618.
- [Do-X] H. Donnelly, F. Xavier, *On the differential form spectrum of negatively curved riemannian manifolds*, Amer. J. Math., **106** (1984), 169-185.

- [E] P. Eberlein, *Lattices in spaces on nonpositive curvature*, Annals of Math., **111** (1980), 435-476.
- [E-F] J.F. Escobar, A. Freire, *The differential form spectrum of manifolds of positive curvature*, Duke Math. J., **69** n°2 (1993), 1-42.
- [G] I. M. Glazman, *Direct methods of qualitative spectral analysis of singular differential operators*, Daniel Davey, New York, 1966.
- [Gr] C. R. Graham, *Volume and area renormalizations for conformally compact Einstein metrics*, Rend. Circ. Mat. Palermo, Suppl. **63** (2000), 31-42.
- [G-W] R. Greene, H. Wu, *Function theory on manifolds which possess a pole*, Springer-Verlag, Lecture Notes in Math., **699** (1979), Berlin, Heidelberg, NY.
- [H-I] E. Heintze, H. C. Im Hof, *Geometry of horospheres*, J. Differential Geom., **12** n°4 (1977), 481-491.
- [Ho] L. Hörmander, *L^2 estimates and existence theorems for the $\bar{\partial}$ operator*, Acta Math., **113**(1965), 89-152.
- [Hi] N. Hitchin, *L^2 -cohomology of hyperkähler quotients*, Comm. Math. Phys., **211** (2000), 153-165.
- [L1] J. Lott, *The zero-in-the-spectrum question*, Enseign. Math., **II Sér.** **42**, n°3-4 (1996), 341-376.
- [L2] J. Lott, *L^2 -cohomology of geometrically infinite hyperbolic 3-manifolds*, Geom. Funct. Anal., **n°1** (1997), 81-119.
- [L3] J. Lott, *On the spectrum of a finite-volume negatively-curved manifold*, Amer. J. Math. **123** n°2 (2001), 185-205.
- [M] R. Mazzeo, *The Hodge cohomology of a conformally compact metric*, J. Differential Geom., **28** n°2 (1988), 309-339.
- [M-P] R. Mazzeo, R. S. Phillips, *Hodge theory on hyperbolic manifolds*, Duke Math. J., **60** n°2 (1990), 509-559.
- [O] T. Ohsawa, *Isomorphism theorems for cohomology groups of weakly 1-complete manifolds*, Publ. RIMS Kyoto Univ., **18** (1982), 191-231.
- [O-T] T. Ohsawa, K. Takegoshi, *Hodge spectral sequence on pseudoconvex domains*, Math. Z., **197** (1988), 1-12.
- [dR] G. de Rham, *Variétés différentiables*, Hermann, Paris, 1960.
- [Z] S. Zucker, *L_2 Cohomology of Warped Products and Arithmetic Groups*, Inventiones Math., **70** (1982), 169-218.